

# Guía rápida Seresto®

Cómo colocar el collar y recomendaciones básicas para gatos y perros.

**Producto veterinario. Esta guía es informativa y no sustituye al prospecto oficial incluido en la caja. Lee siempre el prospecto antes de usarlo. Ante dudas sobre edad, peso, estado del animal, gestación, lactancia o compatibilidad con otros tratamientos, consulta con tu veterinario.**

## Elige el formato correcto

| Gatos                 | 38 cm | Imidacloprid 1,25 g + flumetrina 0,56 g |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------|
| Perros hasta 8 kg     | 38 cm | Imidacloprid 1,25 g + flumetrina 0,56 g |
| Perros de más de 8 kg | 70 cm | Imidacloprid 4,50 g + flumetrina 2,03 g |

Un collar por animal. Uso cutáneo y externo. Los gatos y perros de hasta 8 kg usan el formato de 38 cm; los perros de más de 8 kg usan el formato de 70 cm.

## Cómo colocarlo paso a paso

**1****Abre el envase en el momento de uso**

Saca el collar de la bolsa protectora justo antes de colocarlo.

**2****Revisa el collar**

Desenróllalo y comprueba que no quedan restos de las tiras de plástico de la parte interior.

**3****Ajusta sin apretar**

Colócalo alrededor del cuello y deja aproximadamente dos dedos de espacio entre el collar y la piel.

**4****Pasa y corta el sobrante**

Pasa el extremo por las hebillas y corta el exceso, dejando unos 2 cm después de la hebilla.

**5****Comprueba el ajuste**

Debe llevarse de forma continua durante el periodo de protección indicado. Revísalo de vez en cuando, especialmente en cachorros o gatitos en crecimiento.

# Recomendaciones de uso responsable

Resumen práctico para entregar al cliente junto con el producto.

## Antes de ponerlo

Retira las garrapatas visibles antes de colocar el collar. Si hay infestación fuerte, puede ser necesario revisar también camas, mantas y zonas de descanso.

## Edad mínima

No usar en gatitos de menos de 10 semanas ni en cachorros de menos de 7 semanas.

## Cuándo ponerlo

Preferiblemente antes del inicio de la temporada de pulgas o garrapatas. En perros con riesgo por flebotomos, conviene anticiparse al periodo de actividad del vector.

## Seguridad en casa

No dejes que los niños jueguen con el collar ni que se lo lleven a la boca. Lava las manos con agua fría después de colocarlo.

## Agua y champú

El collar es resistente al agua, pero conviene evitar exposiciones intensas y prolongadas al agua o champús frecuentes, porque pueden reducir la duración de la actividad.

## Consulta veterinaria

Si aparecen reacciones persistentes, cambios preocupantes o dudas sobre el animal, retira el collar si procede y consulta con tu veterinario.

## Precauciones que conviene recordar

### Uso y seguimiento

- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a los principios activos o a algún excipiente.
- No está recomendado durante gestación y lactancia si no hay criterio veterinario.
- En los primeros días algunos animales pueden rascarse o mostrar pequeñas reacciones en la zona del collar. Comprueba que no esté demasiado apretado.
- Las garrapatas presentes antes de la colocación pueden seguir visibles durante las primeras 48 horas; por eso conviene retirarlas antes.

### Conservación y eliminación

- Mantén la bolsa del collar dentro de la caja hasta el momento de uso.
- Guarda el producto fuera de la vista y el alcance de los niños.
- No elimines medicamentos veterinarios por aguas residuales ni vertidos domésticos. Consulta a tu veterinario o farmacéutico cómo desechar restos o producto no utilizado.
- No verter en cursos de agua: sus principios activos pueden resultar peligrosos para peces y otros organismos acuáticos.

**Fuente informativa:** resumen elaborado a partir de los prospectos oficiales de Seresto publicados en CIMAVET/AEMPS para España. Versión de este descargable: mayo de 2026. La información válida es siempre la del prospecto oficial incluido en el envase o la versión oficial vigente.